


Phyt.

696

n

Phyt. 696 <sup>n</sup>

Phory



# ROSA CANDOLLEANA

SEU

## DESCRIPTIO

NOVAE SPECIEI GENERIS

'ROSÆ,

DICATA

PYR.-AUG. DE CANDOLLE,

▲

CL.-ANT. THORY,

IN PRIMA PARISIORUM CIVITATIS CIRCUMSCRIPTIONE

AEDILI VICARIO;

ADDITO

Catalogo inedito Rosarum quas Andreas DU PONT  
in horto suo studiosè colebat anno 1813;

*CUM FIGURA AENEÆ PICTA.*



PARISIIS,

Apud D<sup>am</sup> HÉRISSANT LE DOUX, typographum Regis,  
Viâ Sainte-Anne, n<sup>o</sup> 20.

---

1819.

## EXPLICATIO TABULÆ.

---

A. B. Foliola et tubus calycis Rosæ Candolleanæ  
pendulinæ magnitudine naturali.

C. Fructus pendulus ejusdem Rosæ magnitudine  
diminutâ.

D. E. Foliola et tubus calycis Rosæ Candolleanæ  
flavescentis magnitudine naturali.







\* *Rosa Candolleana elegans*.

H. J. Redouté pinx.

OPTIMO

NEC NON COMMENDABILI

VIRO

DOMINO DOCTORI

PyR.-Aug. DE CANDOLLE,

BOTANICES PROFESSORI IN FACULTATIBUS MEDICINÆ  
ET SCIENTIARUM ACADEMIÆ

GENEVENSIS,

DE HISTORIA NATURALI

OPTIME MERITO.

~~~~~

**R**EI herbariæ studio raptus, amicisque  
suadentibus, aliqua scripsi de singulis  
Rosarum speciebus quas tam peritè deli-  
neavit vir mihi amicissimus *P.-J. Redouté*.  
Nunc igitur, cùm annotationes meæ, licet  
incompositæ, perfectissimis iconibus ad-

ditæ sint, eo fit ut ( quæ mihi non mediocris gloria fuit ) in aliquam partem venerim egregii operis illius ubi cernuntur pulchræ illæ Rosarum species tam felici scalpro representatæ.

Jamdudum studio Rosarum addictus, assiduis scrutatus sum indagationibus quidquid varietatis in hisce floribus animadvertendum est qui in hortis, in sylvis et per ipsa locorum inculta, tantâ vi copiâque luxuriant. Hanc inter vitæ meæ delectationem, repetitis explorationibus, Rosarum seminibus iterum atque iterum terræ mandatis, attentis oculis hæc ad lucem erumpentia circumspexi; ita fit ut Rosas quasdam, gentilitiis quasi notis signatas et in unâ privatâque tribu ordinandas, licet ortas a vulgari origine, deprehenderim. Cùm igitur singulæ eundem semper oris habitum retinerent, qui sincerus apud innumeras neptes propagabatur, ex signis quæ certa fecerunt nonnullæ indagationes meæ et clarissimi Viri And. Du Pont diligentia, agnovi communem naturam illam ex quâ, ut plurimi



senserunt auctores , species assignari possunt.

Sic, currente anno 1817, speciem quamdam Rosæ *Reduteanam* nominavi quam in re botanicâ diligentiores justo dictam de nomine arbitrati sunt, quamque clarissimi nominis causâ, singulari quodam amore jàm fovere videntur.

Liceat ergò, Vir clarissime, de quo nunc superbit Geneva, et olim Galliæ decus ac ornamentum, liceat me nunc Rosæ speciem, non minori curâ quàm *Reduteanam* probatam confirmatamque, nobili aliquâ consecratione propagare, hoc de tuo nomine, Rosam CANDOLLEANAM signando. Nos ex hâc nuncupatione tuum nomen recordari patêre, quemadmodum ex tuo nomine dulcis subito fit commemoratio multorum tuorum operum jàm editorum, et nuper operis illius cui titulus est : *Regni Vegetabilium Systema naturale*. Tantis fretus auspiciis, flos ipse, oblatumque nomen quo designari potest, si huic annueris, nullo alio auxilio egent,

quo propagari queant et unanimi consensu mox confirmari : ne igitur , celeberrime Professor , ne reverentiæ nostræ hoc specimen dedigneris quod ultrò sincerique tibi deferimus.

Hactenùs , doctissime Vir , illud a te acceptum referre debeo quod tuâ benevolentia me amplificaveris , studiorum meorum sedulus hortator , cùm in hâc novissimâ tempestate Roseta mea digna judicavisti quæ illa inviseris. Si nunc voto meo annueris ; si tuis auspiciis novam speciem , quam nuper ignotam , diligenti culturâ in lucem protuli , adoptione quâdam excipere volueris , quàm mihi pergratum erit quod nostrum hunc flosculum coronæ adjungere possim quâ certatim et naturæ docti et amantes jamdudùm frontem tuam præcinctam voluerunt !

CL. - ANT. THORY.

Dabam Lutetiæ , die 15 mensis  
februarii anno 1819.

# ROSA CANDOLLEANA

SEU

## DESCRIPTIO

NOVÆ SPECIEI GENERIS

## ROSÆ.



### ROSA CANDOLLEANA.

**R**osa germinibus ovatis, glabris; pedunculis glabris hispidisve; caulibus ramulisque setis confertissimis minimis subæqualibus tectis; foliolis inæqualiter serratis.

#### (*a*) ELEGANS.

Rosa Candolleana germinibus pedunculisque glabris; foliolis suprâ viridibus, subtùs pallidioribus; petiolis villosis subaculeatis; laciniis calycinis intùs et margine villosulis, extùs glandulis sessilibus præditis; petalis albis extùs rubrofasciatis.

Rosier très-épineux à pétales rayés de rose en-dehors; DU PONT, Cat. inéd., serie 4<sup>e</sup>, n° 8.

*HABITUS.* Frutex erectus 3-4 pedalis, et altior.

Rami juniores setis spinuliformibus, confertissimis, subæqualibus, rectis tecti; adultiores aculeis emortuis evanescentibus scabrosi.

Petioli pubescentes, subinermes.

Foliola quina vel septena, nonnulla acuta, nonnulla obtusa, suprâ viridia, subtùs pallidiora, subglaucescentia, inæqualiter serrata, margine colorata.

Stipulæ apice acuminatæ, margine glanduloso ciliatæ.

Pedunculi ramulos terminantes multiflori, glabri, bracteis præditi.

Calycis tubus ovatus, glaber.

Lacinia calycina integerrimæ, corollam inapertam superantes, intùs tomentosæ, extùs glandulis sessilibus obovallatæ.

Petala quinque, obcordata, intùs alba, extùs rubro-fasciata.

Stigmata sessilia.

Fructus ovato-rotundus, maturus ruber.

#### OBSERVATIO.

Rosa Candolleana elegans proxima Rosæ Redutæ glauçæ (ТНХ., *Ros. Red.*, p. 3, cum fig.; RED., *Roses*, p. et tab. 101); sed hæc ultima diversa :

1° Caulibus glabris aculeis solidis persistentibus armatis, nec setaceis deciduisque uti in nostrâ varietate;

2° Foliolis simpliciter dentatis;

3° Petalis intus et apice rubello punctatis.

Rosa autem hispida (PORR., *Ency.*, vol. 6, p. 286, n° 15) differt a Rosâ Candolleana elegante :

1° Aculeis, sparsis solidisque;

2° Foliolis subtus tomentosis;

3° Ramulis unifloris;

4° Et deniquè tubo calycis pedunculisque glanduloso-hirsutis.

### (s) PENDULA.

Rosa Candolleana germinibus ovatis, glabris; pedunculis subhispidis; foliis ellipticis, pallidè virescentibus, subconcoloribus; fructibus subglobosis, pendulis.

*HABITUS.* Frutex ramosus, circiter 4 - pedalis.

Petioli villosi, rarò aculeati.

Foliola septena vel novena subduplo majora quàm in præcedente, elliptica basi apiceque obtusa.

Stipulæ acuminatæ, basi integerrimæ, supernè glanduloso-subdenticulatæ.

Pedunculi nonnulli glabri, nonnulli setis glandosis muniti.

Laciniæ calycinæ simplices, corollam apertam paululum superantes, apice subdilatae.

Petala quinque, obcordata, pallidè rosea, extùs rubro-fasciata.

Fructus ovato-globosus, glaber, pallidè purpureus, laciniis calycinis diù persistentibus coronatus, pendulus.

Cætera uti in variatione *a*.

#### OBSERVATIO.

Differt a Rosâ pendulinâ (L., sp. 705, vel Alpinâ pendulinâ, REDOUTÉ, *Roses*, vol. 1, pag. et tab. 57) caulibus setis confertissimis præditis, fructibus ovato-globosis, aliisque notis.

A Rosâ pimpinellifoliâ (L., sp. 703, RED., *Roses*, p. et tab. 83) :

1° Ramulis multifloris ;

2° Foliolis duplicato-dentatis triplo majoribus ;

3° Laciniis calycinis corollam inapertam superantibus.

Rosa verò myriacantha (D. C., *Flore française*, ed. 3, n° 3698) est distincta :

1° Foliolis minimis, subrotundis ;

2° Aculeis subsolidis, quintuplo majoribus ;

3° Ramulis unifloris ;

4° Laciniis calycinis brevioribus.

#### (*γ*) FLAVESCENS.

Rosa Candolleana germinibus obovatis, turgidis, pedunculisque glabris ; foliis suprà glabris,

subtùs subpubescentibus; petalis pallidè flavescentibus.

R. (spinosissima) sulphurea, flore variegato;  
DU PONT, loc. cit., n° 18.

R. fructibus globosis calycibusque glabris; aculeis ramorum setaceis confertis; stipulis linearibus; *Sims.* in CURT., Bot. mag., tab. 1570.

R. (hispidà); POIR., *Ency.*, vol. 4, 2° part., p. 715; — non POIR., loc. cit., vol. 6, p. 286, n° 15.

**HABITUS.** Frutex magnitudine 1-1½ ped. ramosissimus.

Rami setis confertissimis tecti uti in varietatibus  $\alpha$  et  $\beta$ .

Ramuli bifurcati 1-2-3-flori.

Petioli glabri, subaculeati.

Stipulæ integerrimæ, lanceolatæ.

Foliola quina vel septena ovalia, suprâ glabra, subtùs subpubescentia.

Pedunculi glabri.

Lacinia calycinæ integerrimæ, corollam inapertam leviùs superantes, intùs villosulæ, extùs subglabræ.

Petala quinque, obovata, obtusè emarginata, pallidè flava, facilè decidua.

Fructus subrotundus.

## OBSERVATIO.

Hæc a præcedentibus differt non solùm notis suprà expositis, sed etiàm alio habitu alioque crescendi modo, et singulariter floribus flavescentibus. Hybrida, verisimiliter, varietatis  $\alpha$ , et Rosæ luteæ, (L.); sed cultura non mutatur.

---

Decimus jàm quintus vertitur annus ex quo detexi Rosas  $\alpha$  et  $\gamma$ , in horto celeberrimi horticultoris And. Du PONT, mortui sub fine anni 1817. Ipse habebat varietatem  $\gamma$ , ut hybridam Rosæ luteæ et nostræ Rosæ  $\alpha$ . Varietatem  $\beta$  ex semine, in horto meo propè Lutetiam, anno 1810, collegi, et non dubitandum est quin sit hybrida Rosæ Alpinæ pendulinæ et Candolleanæ elegantis: sed omnes, multotiès inseminatae, culturâ ferè non mutatae sunt. Hæ, cæterùm, Rosæ primo intuitu facilè dignoscentur ramis ramulisque omninò setis mollibus obductis, et habitu proprio qui non reperitur in aliis generis Rosæ speciebus.

---



---

AND. DU PONT

GYMNASIUM ROSARUM

SEU

TRANSCRIPTIO,

*Conferta cum Catalogo autographo Rosarum  
quas in horto suo ipse colebat,*

anno 1813 (1).

---

I. CANINAE.

II. RUBIGINOSAE.

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Rosa canina vulgaris. | 1. Rosa rubiginosa vulgaris.  |
| 2. — semiplena.          | 2. — semiplena.               |
| 3. — subglauca.          | 3. — plena.                   |
| 4. — fl. albo.           | 4. — aculeatissima.           |
| 5. — rosea subinermis.   | 5. — Persica, <i>Olivier.</i> |
| 6. — myrtifolia.         | 6. — alterna, <i>Cels.</i>    |
- 

(1) Nomina Rosarum in hocce Catalogo, usque-adhuc inedito, scripsit aliquandò latinè, aliquandò gallicè.

- |                                              |                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 7. Rosa rubiginosa semiplena, <i>Zabeth.</i> | 14. R. sp. inermis ex semine.                  |
| 8. — — semiplena, <i>petite Hessoise.</i>    | 15. — — nova variegata, <i>la belle Laure.</i> |
| 9. — — simplex fol. rugosis.                 | 16. — — Scotica, <i>légèrement panachée.</i>   |
|                                              | 17. — — hybrida cum Alpina.                    |

## III. ARVENSES.

1. — arvensis repens.  
2. — — stans.

18. — — sulphurea fl. variegato.

## V. VILLOSAE.

## IV. SPINOSISSIMAE.

- |                                                     |                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. — spin. alba.                                    | 1. — villosa pomifera simplex.           |
| 2. — — rubra.                                       | 2. — — minor var., <i>Trianon.</i>       |
| 3. — — duplex.                                      | 3. — — foliolis variegatis.              |
| 4. — — subduplex.                                   | 4. — — duplex.                           |
| 5. — — duplex fl. carneo.                           | 5. — — Parisiensis, ex <i>Thuillier.</i> |
| 6. — — simplex, <i>Rose tendre.</i>                 | 6. — — inermis fl. pendulo.              |
| 7. — — <i>Rose foncée, très-odorante.</i>           | 7. — — Evratina fl. pleno.               |
| 8. — — <i>pétales rayés de rose en-dehors.</i>      | VI. RUBRIFOLIAE, seu <i>glaucae.</i>     |
| 9. — — maxima.                                      |                                          |
| 10. — — <i>fleurs rose très-tendre.</i>             | 1. — glauca.                             |
| 11. — — pumila.                                     | 2. — — racemosa, <i>Villars.</i>         |
| 12. — — <i>vergetée de rose, feuilles glauques.</i> | VII. ALPINAE.                            |
| 13. — — subinermis.                                 | 1. — Alpina vulgaris.                    |

2. R. Alp. lagenariapendula.

3. — — Pyrenaica mitisima, *Lemonier*.

4. — — simplex, de Chine, *Lemonier*.

5. — — duplex, *Lemonier* et *Michaux*.

# XI. SABINAE.

1. Rosa sabina.

# XII. ECHINATAE.

1. — echinata.

# VIII. EGLANTERIAE.

1. — eglanteria lutea sub-simplex.

2. — — bicolor austriaca.

3. — — tulipa, variété avec des pétales à moitié jaunes et à moitié ponceau.

# XIII. KAMSCHATICAE.

1. — Kamschatica.

# XIV. LUCIDAE.

1. — lucida simplex.

2. — — multiplex.

# IX. CINNAMOMEAE.

1. — cinnamomea simplex.

2. — — maialis, nebulosa, infra spinosa.

3. — — spinosa simplex, *Virginie*.

4. — — duplex, idem.

# XV. SORBIFOLIAE.

1. — sorbifolia.

# XVI. PARVIFLORAE.

1. — parviflora.

# XVII. HOLLANDICAE.

# X. CRETICAE.

1. — *Hollandica magna*.

2. — — parva.

1. — Cretica, *Corfou*.

## XVIII. CENTIFOLIAE.

26. *Rosa centifolia nana*,  
centre pourpre.
27. — — Campaniaca.
1. *Rosa centifolia simplex*, 28. — — *de Carlsrouhe*.  
*la Louise*.
2. — — *rouge plus foncé*. 29. — — *de Hesse*.
3. — — subsimplex. 30. — — *Anglica*.
4. — — semiplena.
5. — — plena.
6. — — rubro radiata.
7. — — fortissima pallida.
8. — — pulcherrima.
9. — — foliacea.
10. — — brassica.
11. — — muscosa.
12. — — nivea.
13. — — carnea.
14. — — multiplex.
15. — — quercifolia.
16. — — bullata.
17. — — subrotundifolia,  
crenata.
18. — — bipinnata.
19. — — unguiculata.
20. — — subapetala.
21. — — parva, foliis sub-  
tùs incanis.
22. — — parva, *Chatenay*.
23. — — *Burdigalensis*.
24. — — *Meldensis*.
25. — — *Burgundiaca*.

## XIX. BIFERAE.

1. — — bifera simplex,  
*Henriette*.
2. — — officinalis, *de*  
*Putaux*.
3. — — plena.
4. — — alba.
5. — — bicolor.
6. — — felicitas, *panachée*.
7. — — Italica.
8. — — perpetua.
9. — — prolifera.
10. — — magna pallida.
11. — — maxima, *Varin*.
12. — — magna, *la Cels*.
13. — — carnea.
14. — — — virginalis.
15. — — — lusitanica.
16. — — *Portlandica*.
17. — — umbellata.
18. — — argentea.
19. — — fasciculata, *en*  
*bouquets*.

## XX. GALLICÆ.

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Rosa Gallica simplex.   | 25. R. G. carmin brillant.  |
| 2. — semiplena.            | 26. — — velours pourpre.    |
| 3. — — variegata.          | 27. — — altissima.          |
| 4. — — plena.              | 28. — — sans pareille cou-  |
| 5. — — bishop.             | ronnée.                     |
| 6. — — Prænestina.         | 29. — — Junon.              |
| 7. — — Maheca.             | 30. — — passe princesse.    |
| 8. — — aquila nigra.       | 31. — — grosse cerise.      |
| 9. — — atro-purpurea se-   | 32. — — belle violette      |
| miplena.                   | foncée large.               |
| 10. — — plena.             | 33. — — à fleurs termi-     |
| 11. — — Angliæ.            | nales.                      |
| 12. — — rosea plena.       | 34. — — rouge formida-      |
| 13. — — cocarde pâle.      | ble (1).                    |
| 14. — — alba pseudo-unica. | 35. — — violette prolifère. |
| 15. — — nana Remensis.     | 36. — — belle pourpre.      |
| 16. — — semiplena magna.   | 37. — — noire couronnée.    |
| 17. — — marmorea plena.    | 38. — — pourpre ardoisée.   |
| 18. — — subnigra.          | 39. — — sultane double.     |
| 19. — — de couleur sombre. | 40. — — incomparable.       |
| 20. — — pourpre belle vio- | 41. — — à fleur très-large. |
| lette.                     | 42. — — atro-purpurea.      |
| 21. — — pourpre violet.    |                             |
| 22. — — belle Flore.       |                             |
| 23. — — renoncule.         |                             |
| 24. — — pourpre charmant.  |                             |

## XXI. ROSÆ GALLICÆ

## Hybridæ.

- |                          |
|--------------------------|
| 1. — Gallica holosoricea |
| nova.                    |
| 2. — — ornem. de parade. |

(1) Hæc formosa varietas dicata And. DU PONT, sub nomine Rosæ Gallicæ Pontianæ. Red., *Roses*, t. 1, p. 75, var. p.

- |                                                                |                                    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 3. R. G. <i>aimable rouge.</i>                                 | 10. Rosa alba subinermis.          |
| 4. — — <i>Belgica rubra.</i>                                   | 11. — — <i>carnea.</i>             |
| 5. — — <i>mutabilis.</i>                                       | 12. — — <i>parva.</i>              |
| 6. — — <i>illustre.</i>                                        | 13. — — <i>Josephina.</i>          |
| 7. — — <i>belle sans flat-<br/>terie.</i>                      | 14. — — <i>ex albo rosea.</i>      |
| 8. — — <i>nouvelle gagnée.</i>                                 | 15. — — <i>subinermis.</i>         |
| 9. — — <i>bois de cent<br/>feuilles, fleur de<br/>Provins.</i> | 16. — — <i>aculeata incarnata.</i> |
|                                                                | 17. — — <i>medio intus luteo.</i>  |
|                                                                | 18. — — <i>inermis subviridis.</i> |

10. — — *beauté tendre.*  
 11. — — *touchante.*  
 12. — — *Virginie.*  
 13. — — *regina.*  
 14. — — *précieuse,*  
 15. — — *de merveille.*  
 16. — — *inermis atro-  
violacea.*  
 17. — — *multiplex.*  
 18. — — *pyramidalis,*

## XXIII. TURBINATÆ.

1. — *turbinata, de  
Francfort.*

## XXIV. SULPHUREÆ.

1. — *sulphurea plena.*  
 2. — *nana.*

## XXV. SEMPERVIRENTES.

## XXII. ALBÆ.

1. — *alba simplex.*  
 2. — *subplena.*  
 3. — *plena.*  
 4. — *fulva.*  
 5. — *regia.*  
 6. — *aurata.*  
 7. — *subinermis.*  
 8. — *subalba.*  
 9. — *nova cælestis.*

1. — *sempervirens sim-  
plex.*  
 2. — *duplex rosea.*  
 3. — *undulata, de  
Chine.*  
 4. — *bracteata, Ma-  
cartney.*  
 5. — *Sinica trifolia.*  
 6. — *Balearica.*

XXVI. MOSCHATAE.

2. Rosa Carolina corymbosa, *baie d'Hudson.*

1. — moschata semper-virens arborea. XXX. SEMPERFLORENTES.

2. — — duplex.

1. — semperflorens, *simple pourpre.*

3. — — plena.

2. — — *double pourpre.*

XXVII. SIMPLICIFOLIAE. 3. — — simplex rosea.

4. — — duplex rosea

1. — simplicifolia Persica, *Olivier.* 5. — — mutabilis.

6. — — *pourpre liseré de blanc.*

XXVIII. PENSYLVANICAE. 7. — — subalba.

1. — Pensylvanica simplex. XXXI. ORIENTALES.

2. — — duplex.

1. — orientalis, *Olivier, Cels.*

XXIX. CAROLINAE.

1. — Carolina vulgaris.

FIN.







